

Brotación		Brote 10 - 20 cm		Brote de 20 a 40 cm		Pre-floración		Floración		Baya de 4 a 8 mm		Baya de 8 a 12 mm		Cierre de racimo		Pinta		Pre - cosecha		Post - cosecha				
REGLAN Emamectin Benzoato 2% + Abamectina 2% 3 - 5 L / Ha				ABATOP Abamectina 20% 0.6 L - 1.0 / Ha																		ABATOP Abamectina 20% 0.6 L - 1.0 / Ha		
 Gentrol Dimethomorph 9% + Chlorothalonil 40 % 0.5 - 0.75 L / 200L		corsario Metalaxil 12.5% + Fosetil Aluminio 37.5% 0.4 - 0.5 Kg / 200L		Efectus Fluazinam 25% + Cymoxanil 20% 1.25 - 1.50 L / Ha																				
				ilustre Pyraclostrobin 6.7% + Dimethomorph 12% 0.2 - 0.3 %																				
NUEVO	Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha				Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha																NUEVO Fusor Hymexazol 36% 1.5 - 2.0 L/Ha			
				Cadena Boscalid 50% 1.2 - 1.4 kg / ha**										FRUCTEM Fludioxonil 25% 0.25 L/200L 1.25 - 1.5 L/ha										
 Tebufort PLUS Tebuconazole 430 g/L 0.06 - 0.08 L / 200 L		NUEVO	Bimate Bupirimate 50% 0.100 L - 0.125 L / 200L		Estoico Tebuconazole 30% + Pyraclostrobin 15% 0.6 - 0.8 L / Ha 0.12 - 0.16 L / 200L								BARRERA Extracto de orégano 29.1 g/L 0.5 - 1.0 L / 200L											
SOPRANO Pyraclostrobin 250 g/L 0.10 - 0.12 L / 200 L		COFRADIA Flutriafol 500 g/L 0.06 - 0.08 L / 200 L 0.3 - 0.4 L /Ha		NUEVO	Nepiram Difenoconazole 25% + Fluopyram 20% 0.15 - 0.20L/200L 0.9 - 1.2L/Ha								NUEVO	Blko Bicarbonato de potasio 85% (SP) 3 - 5 kg/Ha										
				KOPASSUS Boscalid 25% + Pyraclostrobin 13% 0.16 - 0.18 Kg / 200L 0.8 - 0.9 Kg / Ha																				
ENVIGO Hexythiazox 25% + Fenpyroximate 20% 0.4 - 0.6 L/200L				ES/ACA Etoxazole 33% 0.020 - 0.025 L /200L																				
		TOPADOR PLUS Spirodiclofen 18 % + Abamectina 2.5 % 0.04 - 0.06 L/200 L																						
TOPADOR Spirodiclofen 24% 0.04% 0.4 L / Ha				Midway Pyridaben 45% 0.08 - 0.1 L /200L																				
				skirla Emamectin Benzoato 5% SG 0.08 - 0.1 Kg/200L																				
								sanicrop Buprofezin 25% + Acetamiprid 10% 0.15 - 0.20 L / 200L				TOLPYRAN Tolfenpyrad 30% SC 0.075 – 0.1 L/200L		Evade^{20 SP} Acetamiprid 20 % 0.10 - 0.15 kg/200 L										
BOMBAI[*] Dinotefuran 80% 0.4 - 0.6 kg/ha				VIVORAL 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha						Invento Spirotetramat 45% 0.04 - 0.08 L/200 L												BOMBAI[*] Dinotefuran 80% 0.4 - 0.6 kg/ha		
		Clofedyn Clothianidin 25% + Tolfenpyrad 15%						NUEVO	Thianax Pyriproxyfen 30% 0.06 - 0.080 L / 200L 0.45 - 0.60 L/Ha														Clofedyn Clothianidin 25% + Tolfenpyrad 15%	
		VIVORAL APLICACIÓN EN DRENCH 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha																				VIVORAL APLICACIÓN EN DRENCH 0.1 - 0.12 kg/200L 1.0 - 1.5 kg/ha		
Armador Chlorfenapyr 25% + Alfacipermetrina 10% 0.125- 0.175 L / 200 L				TOLPYRAN Tolfenpyrad 30% 0.150 - 0.250 L/200L				PIRATE Lambda-cyhalothrin 5% 0.10- 0.15 L / 200 L				Perpetuo Spinosad 48% 0.03 L / 200 L 0.09 L / Ha												
Crisuron Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 kg/200L																				Crisuron Halosulfuron methyl 75% 0.05 - 0.06 kg/200L				

* Aplicación vía sistema de riego.
** Revisar exigencias de LMR´s en países destino y aplicar sólo en post cosecha o en la poda de formación.
*** *Volumen de agua: 1000 L/ha.



GUIA NUTRICIONAL
VID



	Brotación	Brote de 10 a 20 cm	Brote de 20 a 40 cm	Pre-floración	Floración	Baya de 4 a 8 mm	Baya de 8 a 12 mm	Cierre de racimo	Pinta	Pre - cosecha	Post - cosecha
Bioestimulantes	MegaRoot APLICACIÓN EN DRENCH Enraizador Bio-Auxínico Materia orgánica 45% + fósforo 12 % + potasio 3.9% + aminoácidos libres 3% 0.5 – 1 L / 200 L 3 – 5 L /ha										
			Puncher Bioestimulante natural con aminoácidos Aminoácidos libres 12% + macro y microelementos 0.4 – 0.5 L / 200L 3 -5 L / ha				Puncher Bioestimulante natural con aminoácidos Aminoácidos libres 12% + macro y microelementos 0.4 – 0.5 L / 200L 3 -5 L / ha				
	NUEVO	GLUTAMAX Promotor del Crecimiento Vegetativo y Desarrollo de frutos Acido Glutámico 20% + Alga Ascophyllum nodosum 10% + Magnesio 0.75% 0.3 - 0.5 L / 200L 3 - 5L/Ha				NUEVO	FRUTIFORT Promotor del crecimiento y engorde de frutos L-Arginina 30% + L-Triptófano 10% + Ácido Glutámico 10% + L-Leucina 5% + Alga Ascophyllum nodosum 1.5% y Microelementos 0.3 L/200L 2-4 L/ha				
	INCENTIVE Concentrado del alga Ascophyllum nodosum 30% + Potasio 5.8% + Macro y Microelementos 0.25 - 0.5 L / 200L 2 - 3 L / Ha										
Inductores de resistencia	AutoCLAVE Óxido de cobre 25% + Oxido de Manganeso 4% + Dióxido de Silicio 3% + Óxido de zinc 3% 0.5 L/200L 2-3 L/ha				Missouri Silicio 30% 0.5 L/200L 3 - 5 L/ha						
	COPPERMAX Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.5 - 0.6 L / 200L 3 - 5 L/Ha					COPPERMAX Sulfato de Cobre Pentahidratado 22% + Aditivos conservantes 12.7% + Zinc 2.7% 0.5 - 0.6 L / 200L 3 - 5 L/Ha					
	ACAPROX Calcio 8% + Silicio 5% + Coadyuvantes 40% 0.2 - 0.3 L/200L 1-3 L/ha					ACAPROX Calcio 8% + Silicio 5% + Coadyuvantes 40% 0.2 - 0.3 L/200L 1-3 L/ha					
Reguladores de Crecimiento	Híbrido Auxina 0.150 g/L / Citoquinina 0.150 g/L / Giberelina 0.150 g/L 0.3-0.5L/200L					SONAR Ác. Giberélico 4% 0.125 - 0.20 L / 200L		swap* Ácido S abscísico 10% p/v 0.4 - 0.8 L / 200L			
				Híbrido Auxina 0.150 g/L / Citoquinina 0.150 g/L / Giberelina 0.150 g/L 0.3-0.5L/200L							
Correctores Nutricionales	CAL40 Fuente de calcio floable micronizado 0.2 - 0.5 L/200L 2-3 L/ha	MAXIZINC Zinc floable micronizado 100% 0.1 - 0.2 L/200L				HIDROX [K] Potasio 35% 0.5 L / 200L 3 - 5 L / Ha					
	PercoSal APLICACIÓN EN DRENCH Ácidos Carboxílicos 40% + Microelementos 2 - 10 L / Ha				CAL40 Fuente de calcio floable micronizado 0.2 - 0.5 L/200L 2-3 L/ha						

PORTAFOLIO
VID



* Riego por gravedad. ** Riego por goteo