

ETIQUETA MEDIDA: 18 X 24 CM
28 de Febrero del 2022
AG

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

Composición:

Halosulfuron methyl 750 g/kg
Aditivos csp... 1kg

Reg. PQUA N° 1466 - SENASA

Titular del registro:

MONTANA S.A.

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210
Ofi. 401, La Molina. Lima -Perú.
Teléfonos: (511) 4193000
E-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 1 kg.

N° de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Exp.:

Formulado por:



WILLOWOOD LIMITED

17/f, Seaview Plaza, N°283
Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan.
Hong Kong



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

ETIQUETA MEDIDA: 18 X 24 CM

28 de Febrero del 2022

AG

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, NO INGERIR.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Consevar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

• Grupo químico: Sulfonilurea

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso del contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos.
- Retirar los lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.
- En caso del contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. Si la irritación persiste, llame a un médico.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco. Si la respiración es irregular o se detiene aplique respiración artificial. Mantener al paciente caliente y llevarlo al médico.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
MONTANA: 419-3000

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **CRISURON** es un herbicida sistémico post-emergente recomendado para el control de algunas malezas de hojas anchas y ciperáceas. También presenta efecto pre-emergente.

• **CRISURON** es absorbido por hojas, brotes y raíces de las malezas translúcándose hacia los órganos vegetativos subterráneos (rizomas y tuberculos), causando el cese del crecimiento de la maleza y posterior muerte. Los síntomas de amarillamiento y detención del crecimiento de las malezas aparecen 7 días después de la aplicación del producto, el control completo puede demorar hasta 28 días dependiendo del tamaño de la maleza y de la humedad del suelo.

• Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, realizar una pre-mezcla en una reducida cantidad de agua en un balde aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual) o equipos accionados por el tractor que se encuentren debidamente calibrados asegurando una adecuada cobertura sobre las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/ha)	PC (Kg/200L)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	"Coquito" "Yuyo"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	0.050 - 0.1	-	1 0.8
Arroz	"Coquito" "Yuyo" "Verdolaga"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	0.04 - 0.06	-	48 0.05
Maíz	"Coquito" "Yuyo"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	-	0.04 - 0.06	30 0.05
Pimiento	"Coquito" "Chamico" "Amor seco" "Hierba del gallinazo"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Chenopodium murale</i>	0.05 - 0.07	-	30 0.01
Vid	"Amor seco" "Coquito" "Verdolaga"	<i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Portulaca oleracea</i>	-	0.06	21 0.01
Palto	Amor seco Coquito	<i>Bidens pilosa</i> <i>Cyperus rotundus</i>	-	0.05 - 0.06	16 0.01

PC: Periodo de Carenado / LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar **CRISURON** cuando el suelo se encuentre en capacidad de campo, sobre malezas en crecimiento activo con 2 a 5 hojas.
- En espárrago aplicar inmediatamente después de culminada la cosecha (brotes menores a 10 cm de altura) o después de la completa apertura de filocladios. No aplicar en el estado de vara o hacerlo de manera dirigida a la maleza. Realizar máximo dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicaciones de 14 a 21 días.
- En el cultivo de vid realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.
- En el cultivo de palto realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.
- Respetar un intervalo de tiempo entre la aplicación de **CRISURON** y el establecimiento de un nuevo cultivo. Para cebolla, ajo, lechuga, zanahoria, apio, brócoli, coliflor, repollo o espinaca esperar 12 meses, 4 meses para papa o pimiento.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CRISURON es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No se recomienda aplicar **CRISURON** en mezcla con insecticidas organofosforados ni que éstos se hayan aplicado 7 días antes o que se apliquen 7 días después de la aplicación de **CRISURON**, debido a que se pueden presentar síntomas de fitotoxicidad en el maíz.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

